

Luxation des Iliosakral- und des Sakro-Kokzygeal-Gelenkes

Filter: Anerkannte Fälle mit Diagnose S33.2_

Fallzahl pro Jahr	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose (1)
Hochgerechnete Anzahl Fälle pro Jahr	72	57
davon mit isolierter Diagnose	24	24

Soziodemographie	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose (1)
Durchschnittliches Alter	41.7	40.9
Median Alter	39.3	34.8
Anteil Berufsunfälle	18%	17%
Anteil Frauen	31%	37%

Heilkosten (in CHF)	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose (1)
Durchschnittliche Heilkosten	58'142	28'548
Median der Heilkosten	2'414	1'324
10% der Fälle haben Heilkosten von weniger als	92	92
10% der Fälle haben Heilkosten von mehr als	128'108	95'512
Anteil dieser 10% der Fälle an den gesamten HK	64%	61%

Versicherungsleistungen Total (in CHF)	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose (1)
Durchschnittliche Versicherungsleistungen	155'867	69'151
Median der Versicherungsleistungen	29'954	4'120
10% der Fälle haben VL von weniger als	98	98
10% der Fälle haben VL von mehr als	312'872	154'335
Anteil dieser 10% der Fälle an den gesamten VL	74%	68%

Entschädigte Tage	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose (1)
Anzahl der Fälle mit entschädigten Tagen pro Jahr	56	41
Anteil der Fälle mit entschädigten Tagen	77%	72%
Durchschnittliche Zahl entschädigter Tage (ohne Renten)	181	128
Median der entschädigten Tage (ohne Renten)	35	25



Renten	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose (1)
Durchschnittliche Anzahl Todesfälle pro Jahr	1	0
Durchschnittliche Anzahl der Fälle mit IR pro Jahr	6	2
Anteil der Fälle mit IR	9%	4%
Durchschnittlicher Invaliditätsgrad über alle Fälle	4.1%	1.1%
Durchschnittlicher Invaliditätsgrad der IR-Fälle	48%	29%
Summe der Invaliditätsgrade pro Jahr	297%	64%
Anteil der Fälle mit IE	14%	8%

Hochrechnung aus einer Stichprobe von 76 anerkannten UVG-Unfällen mit Diagnose(n) S332_
 in den Jahren 2010-2014, davon 38 mit dieser(n) Hauptdiagnose(n)

(1) Als traumatische Hauptdiagnose wird bei Fällen mit mehreren Verletzungen diejenige betrachtet,
 für die im Mittel über alle Fälle mit dieser Diagnose die höchsten Heilkosten beobachtet werden.

Luxation des Iliosakral- und des Sakro-Kokzygeal-Gelenkes

Filter: Anerkannte Fälle mit traumatischer Hauptdiagnose S332_



(2) für alle Fälle mit traumatischer Hauptdiagnose