

Verletzung des N. ischiadicus in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels

Filter: Anerkannte Fälle mit Diagnose S74.0_

Fallzahl pro Jahr	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose (1)
Hochgerechnete Anzahl Fälle pro Jahr	58	36
davon mit isolierter Diagnose	8	8

Soziodemographie	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose (1)
Durchschnittliches Alter	39.9	40.9
Median Alter	40.5	40.6
Anteil Berufsunfälle	25%	36%
Anteil Frauen	17%	2%

Heilkosten (in CHF)	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose (1)
Durchschnittliche Heilkosten	45'169	20'251
Median der Heilkosten	10'947	1'226
10% der Fälle haben Heilkosten von weniger als	372	175
10% der Fälle haben Heilkosten von mehr als	120'075	51'330
Anteil dieser 10% der Fälle an den gesamten HK	68%	87%

Versicherungsleistungen Total (in CHF)	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose (1)
Durchschnittliche Versicherungsleistungen	111'271	62'645
Median der Versicherungsleistungen	13'818	3'058
10% der Fälle haben VL von weniger als	372	175
10% der Fälle haben VL von mehr als	279'608	127'388
Anteil dieser 10% der Fälle an den gesamten VL	73%	86%

Entschädigte Tage	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose (1)
Anzahl der Fälle mit entschädigten Tagen pro Jahr	50	28
Anteil der Fälle mit entschädigten Tagen	86%	78%
Durchschnittliche Zahl entschädigter Tage (ohne Renten)	171	106
Median der entschädigten Tage (ohne Renten)	69	12



Renten	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose (1)
Durchschnittliche Anzahl Todesfälle pro Jahr	0	0
Durchschnittliche Anzahl der Fälle mit IR pro Jahr	4	2
Anteil der Fälle mit IR	7%	5%
Durchschnittlicher Invaliditätsgrad über alle Fälle	3.3%	2.4%
Durchschnittlicher Invaliditätsgrad der IR-Fälle	47%	47%
Summe der Invaliditätsgrade pro Jahr	190%	85%
Anteil der Fälle mit IE	16%	12%

Hochrechnung aus einer Stichprobe von 60 anerkannten UVG-Unfällen mit Diagnose(n) S740_
 in den Jahren 2010-2014, davon 30 mit dieser(n) Hauptdiagnose(n)

(1) Als traumatische Hauptdiagnose wird bei Fällen mit mehreren Verletzungen diejenige betrachtet,
 für die im Mittel über alle Fälle mit dieser Diagnose die höchsten Heilkosten beobachtet werden.

Verletzung des N. ischiadicus in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels

Filter: Anerkannte Fälle mit traumatischer Hauptdiagnose S740_



(2) für alle Fälle mit traumatischer Hauptdiagnose